

สำหรับการฉีดเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster dose)

	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	ระยะห่างระหว่างเข็ม		เข็มที่ 3	หมายเหตุ
วัคซีน กระตุ้น เข็มที่ 3	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	4 สัปดาห์		AstraZeneca	หมายเหตุ 1. เห็นทางเลือกได้ ผู้รับวัคซีนสามารถรับการฉีด วัคซีน AZ เป็นเข็มกระตุ้นได้ ในผู้ที่รับการฉีด AZ ครบ 2 เข็ม โดยพิจารณาจาก เข็มที่ 2 เป็นเวลา 6 เดือนขึ้น ไป จนถึงผู้ที่มีภูมิคุ้มกัน ต่ำหรือไม่สามารถฉีดวัคซีนสูตร AZ-AZ-AZ ผู้ใดอาจไม่เหมาะ การฉีดวัคซีน AZ-AZ-PF ได้ พิจารณาฉีดผู้ที่มีผลตรวจ IgG4A
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer	
	Pfizer	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer	
	AstraZeneca	Pfizer	3 เดือน ขึ้นไป		Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	3 เดือน ขึ้นไป		AstraZeneca	
วัคซีนกระตุ้น เข็มที่ 4	เข็มที่ 1	เข็มที่ 2	เข็มที่ 3	ระยะห่างระหว่างเข็ม	เข็มที่ 4	2. วัคซีน Moderna mRNA เป็นเข็มกระตุ้นได้ในทุก วัคซีนข้างต้น
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	AstraZeneca	
	Sinovac/Sinopharm	Sinovac/Sinopharm	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	
	Sinovac/Sinopharm	AstraZeneca	AstraZeneca	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	
	AstraZeneca	AstraZeneca	Pfizer	4 เดือน ขึ้นไป	Pfizer	

การฉีดวัคซีน Pfizer สามารถฉีดตามเวลาที่ใกล้เคียงกันได้ ไม่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างที่แน่นอน ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วสามารถรับการฉีดเข็มกระตุ้นได้