

# โรคไข้มาลาเรีย

เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อปรสิตพลาสมาสโมเลีย  
มีช่วงพักแฝงตั้งแต่เป็นพาหะ



ติดต่อสู่คนได้อย่างไร?

ช่วงพักแฝง

ผู้ป่วยมาลาเรีย

ช่วงพักแฝงที่มีเชื้อมาลาเรีย

คนปกติ



อาการของไข้มาลาเรีย

หลังจากได้รับเชื้อ 10-14 วัน

- มีไข้ หนาวสั่น
- ปวดศีรษะ
- ปวดเมื่อยตามข้อและกล้ามเนื้อ
- คลื่นไส้
- เบื่ออาหาร



เมื่อตรวจพบผู้ป่วยเชื้อ ได้รับยาฆ่าปรสิตให้ครบ  
และไปตรวจเลือดซ้ำตามนัด เพื่อป้องกันการ  
การป่วนและการติดเชื้อ

การป้องกันไข้มาลาเรีย



พ่นยาฆ่าแมลงตามอาคาร



ทายากันยุงนอกเสื้อผ้า



สวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด



# ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย



## สาเหตุของโรคมาลาเรีย

โรคมาลาเรียเป็นโรคติดต่อเกิดจากเชื้อพลาสโมเดียม มีทั้งหมด 4 ชนิด คือ

พลาสโมเดียม ฟัลซิพารัม พลาสโมเดียม มาลาเรีย  
พลาสโมเดียม ไวเวกซ์ พลาสโมเดียม โอวาล์

## การติดต่อของโรคมาลาเรีย

มีผู้คนปรารถนาจะเป็นคนนำเชื้อจากผู้ป่วยมาลาเรีย ไปยังผู้อื่นโดย  
ผู้คนที่ปรารถนาจะมีเชื้อมาลาเรียในส้อมนำสายก๊อตและปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดคน



อาการของโรคมาลาเรียจะปรากฏ  
หลังจากเชื้อมาลาเรียเข้าสู่ร่างกาย  
(เฉลี่ยแล้วใช้เวลา 10-14 วัน)  
มีอาการไม่สบาย ปวดศีรษะ มีไข้  
ปวดเมื่อยตัว และเสีย นอนอาหาร

ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงของโรคมาลาเรีย  
มาลาเรียขึ้นสมอง การนำกลไกในเลือดทำ  
เซลล์เม็ดเลือดขาวเข้า ไทลีสมาท  
ปอดบวม ทำให้ผู้ป่วยตายได้



## การตรวจโรคมาลาเรีย

นอกจากการตรวจเลือดแล้ว ยังต้องตรวจหาเชื้อมาลาเรียในไขกระดูก  
โดยใช้การตรวจไขกระดูกที่ปลายนิ้วของผู้ป่วย

นำมาเชื่อมเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรีย  
ด้วยกล้องจุลทรรศน์  
หรือใช้ชุดตรวจสำเร็จรูป



## การป้องกันตนเองจากโรคมาลาเรีย

1. การนอนในมุ้งชุบน้ำยา  
พ่นยาฆ่าแมลงในช่วงเวลาเย็น  
ถึงกับคน และห้ามยักมือ  
กับแมลงวันกัดคนเพราะ  
น้ำยาจะระเหยออก



2. การสวมเสื้อผาปกปิด  
ร่างกายให้มิดชิด เช่น  
ใช้เสื้อแขนยาว  
กางเกงขายาว



3. การใช้ยาทาป้องกัน



4. การใช้ยาจุดกันยุง



จากนี้ เราจะใช้การป้องกันมาลาเรียอย่างจริงจัง  
ต้องป้องกันโรคมาลาเรียไม่ให้กลับมาอีก

