



โรคพิษสุนัขบ้า

เป็นแล้วตาย

ป้องกันได้ด้วยวัคซีน



คำแนะนำ
สำหรับคนเลี้ยง
สุนัขและแมว




ฉีดวัคซีน

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้สัตว์เลี้ยง 2 ครั้ง ครั้งแรก
เมื่ออายุ 3-6 เดือน และฉีดซ้ำเมื่ออายุ 1 ปี



ทำพาสปอร์ต

ไม่มีสัตว์บกเข้าบ้าน



เลี้ยงสุนัขในบ้าน

ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง
ให้ไปหาคนอื่น

เมื่อลูก
สุนัขหรือแมว
กัด ข่วน เลีย
บาดแผล ต้องรีบ...



ควรล้างแผล
เมื่อโดนกัดข่วน
ตามทุกจุด!!



สุนัขหรือแมว
ที่มีเจ้าของ
ควรไปฉีดวัคซีน
เมื่ออายุ 3 เดือน



อย่า
ปล่อยให้
แมวเข้าบ้าน

ล้างแผล ใส่ยา กักหมา ฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยง



ล้างแผล

ล้างแผลและใช้ยาตาม
คำแนะนำ ของแพทย์



ใส่ยา

ใช้ยาตาม
คำแนะนำ



กักหมา

ใส่กรง 10 วัน
ห้ามคนเลี้ยงเข้าใกล้



พาสปอร์ต

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
เมื่ออายุ 3 เดือน

คาถา 5 ย ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



**อย่า
แยก**

อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยง
ไปติดกับคนอื่น



**อย่า
เลี้ยง**

อย่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน



**อย่า
ปล่อย**

อย่าปล่อยสัตว์เลี้ยง
ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน

**อย่า
เลี้ยง**



**อย่า
เลี้ยง**



โปรด



ให้อาหารแก่สุนัข
หรือแมวจรจัด

นอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง
ตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ และควรให้สัตว์เลี้ยง
ฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลา และควรให้สัตว์เลี้ยง
ไปฉีดวัคซีนตามคำแนะนำ



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



ทำอะไรเมื่อ.... ถูกสุนัขกัด ช่วน

+



ล้างแผล

ด้วยน้ำสะอาด และสบู่เบาๆหลายๆครั้ง




ใส่ยา

เช็ดแผลให้แห้งแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ



ขังสัตว์

เพื่อสังเกตอาการ 10 - 15 วัน



หาหมอ

เพื่อรักษาและฉีดวัคซีนตามกำหนด